

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2015年8月3日	
申請者	所属科: 外科	医師名: 山中 千尋
抗癌剤プロトコール内容		
略名	SOX+Cmab療法	
適応臓器名	KRAS野生型の進行・再発大腸癌	
薬剤名	ティーエスワン(一般名:テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム) オキサリプラチン点滴静注液(一般名:オキサリプラチン) アービタックス注射液(一般名:セツキシマブ)	
注意点	各薬剤の添付文書に順ずる	
用法・用量・投与スケジュール		
<C-mab 毎週投与の場合> 3週間(21日間)を1サイクルとして以下の投与を繰り返す day1・8・15 セツキシマブ 400mg/m ² 2時間(2回目以降 250mg/m ² 1時間) 点滴静注 day1 オキサリプラチン 130mg/m ² 2時間 点滴静注 day1～day14(14日間) TS-1 80mg/m ² /日 1日2回(朝・夕食後)経口投与し、その後7日間休薬する 又は day1の夕食後～day15の朝食後まで経口投与し、その後7日間休薬する <C-mab 2週毎投与の場合> 6週間(42日間)を2サイクルとして以下の投与を繰り返す day1・15・29 セツキシマブ 500mg/m ² 2時間 点滴静注 day1・22 オキサリプラチン 130mg/m ² 2時間 点滴静注 day1～day14(14日間)およびday22～day35(14日間) TS-1 80mg/m ² /日 1日2回(朝・夕食後)経口投与し、その後7日間休薬する 又は day1の夕食後～day15の朝食後まで経口投与し、その後7日間休薬する		
Evidence	SOX-BC Study(MCSGO-1107) KRAS野生型の進行・再発大腸癌に対するSOX+Bmab療法とSOX+Cmab療法の 無作為化比較第II相試験	
備考	2015年7月13日 倫理委員会にて承認済み	
がん化学療法委員会承認日: 2015年8月18日		