

抗がん剤レジメン 届け票

申請日	2009年10月 5日													
申請者	所属科: 外科	医師名: 塚原 康生												
抗癌剤プロトコール内容														
略名	XELOX													
適応臓器名	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 結腸癌における術後補助化学療法 治癒切除不能な進行・再発の胃癌													
薬剤名	ゼローダ錠 300 (一般名: カペシタビン) エルプラット点滴静注液 (一般名: オキサリプラチン)													
注意点	各薬剤の添付文書に順ずる													
用法・用量・投与スケジュール														
3週間(21日間)を1サイクルとして以下の投与を繰り返す														
Day1														
5HT3 受容体拮抗型制吐剤+デキサメタゾン 点滴静注														
オキサリプラチン 130mg/m ² 2時間 点滴静注														
カペシタビン														
Day1 夕食後~Day15 朝食後 1日2回14日間経口投与 (投与量は下表を参照)														
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">カペシタビン(1,000 m²/日)</th> </tr> <tr> <th>体表面積</th> <th>1日用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.36 m²未満</td> <td>8錠</td> </tr> <tr> <td>1.36 m²以上 1.66 m²未満</td> <td>10錠</td> </tr> <tr> <td>1.66 m²以上 1.96 m²未満</td> <td>12錠</td> </tr> <tr> <td>1.96 m²以上</td> <td>14錠</td> </tr> </tbody> </table>			カペシタビン(1,000 m ² /日)		体表面積	1日用量	1.36 m ² 未満	8錠	1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	10錠	1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	12錠	1.96 m ² 以上	14錠
カペシタビン(1,000 m ² /日)														
体表面積	1日用量													
1.36 m ² 未満	8錠													
1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	10錠													
1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	12錠													
1.96 m ² 以上	14錠													
Evidence	NCCN ガイドライン 大腸癌治療ガイドライン 海外第Ⅲ相試験 (REAL-2 試験)													
備考														
がん化学療法委員会承認日: 2010年1月15日 がん化学療法委員会承認日: 2014年11月17日改定														