

抗がん剤レジメン 届け票

申請日	2018年8月16日													
申請者	所属科:外科	医師名: 三宅 泰裕												
抗がん剤プロトコール内容														
略名	ゼローダ+Bmab 療法													
適応臓器名	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌													
薬剤名	ゼローダ錠 (一般名: カペシタビン) アバスチン点滴静注液 (一般名: ベバシズマブ (遺伝子組み換え))													
注意点	各薬剤の添付文書に順ずる													
用法・用量・投与スケジュール														
<p>3週間 (21日間) を1サイクルとして以下の投与を繰り返す</p> <p>Day1</p> <p>生食 100mL</p> <p>ベバシズマブ 7.5mg/kg 初回 90分間、2回目 60分間、3回目以降 30分間 点滴静注</p> <p>カペシタビン錠</p> <p>Day1 夕食後～Day15 朝食後 1日2回 14日間経口投与 (投与量は下表を参照)</p>														
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">カペシタビン</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">体表面積</th> <th style="text-align: center;">1回用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.36 m²未満</td> <td style="text-align: center;">1200mg/回</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.36 m²以上 1.66 m²未満</td> <td style="text-align: center;">1500mg/回</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.66 m²以上 1.96 m²未満</td> <td style="text-align: center;">1800mg/回</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.96 m²以上</td> <td style="text-align: center;">2100mg/回</td> </tr> </tbody> </table>			カペシタビン		体表面積	1回用量	1.36 m ² 未満	1200mg/回	1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	1500mg/回	1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	1800mg/回	1.96 m ² 以上	2100mg/回
カペシタビン														
体表面積	1回用量													
1.36 m ² 未満	1200mg/回													
1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	1500mg/回													
1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	1800mg/回													
1.96 m ² 以上	2100mg/回													
Evidence	大腸癌治療ガイドライン													
備考														
がん化学療法委員会承認日: 2018年8月20日														