

抗がん剤レジメン登録票

申請日	2014年5月12日	
申請者	所属科: 外科	医師名: 鈴木 玲
抗癌剤レジメン内容		
略名		
適応臓器名	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌(標準的な治療が困難な場合に限る)	
薬剤名	ロンサーフ配合錠T15(一般名:トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠) ロンサーフ配合錠T20(一般名:トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠)	
注意点	適正使用ガイドラインに準じて使用すること	
用法・用量・投与スケジュール		
<p>朝食後及び夕食後の1日2回、5日間連続経口投与したのち2日間休薬する。 これを2回繰り返したのち14日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。 初回投与量:トリフルリジンとして約35mg/m²/回 空腹時投与を避けること 50mg/日を投与する場合は、朝食後に20mgを、夕食後に30mgを投与する。</p>		
	投与開始基準 投与再開基準	休薬基準
血色素量	8以上	7未満
好中球数	1,500以上	1,000未満
血小板数	75,000以上	50,000未満
総ビリルビン	1.5以下	2以上
AST(GOT) ALT(GPT)	施設基準値上限の2.5倍 (肝転移症例では5倍)以下	施設基準値上限の2.5倍 (肝転移症例では5倍)を超える
クレアチニン	1.5以下	1.5を超える
末梢神経障害	Grade2以下	Grade3以上
非血液毒性	Grade1以下	Grade3以上
Evidence	進行・再発の結腸・直腸癌を対象とした多施設共同二重盲検無作為化第Ⅱ相比較試験 <J003試験>	
備考		
がん化学療法委員会承認日: 2014年5月19日		