

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	平成 2011 年 3 月 22 日	
申請者	所属科: 外科	医師名: 渡辺 康則 渡辺
抗癌剤プロトコール内容		
略名	XP(ゼローダ+シスプラチン)療法	
適応臓器名	進行・再発胃癌	
薬剤名	シスプラチン製剤(CDDP) (商品名:ランダ注) カペシタビン錠(XEL) (商品名:ゼローダ錠 300)	
注意点	各薬剤の注意点を遵守すること。	
用法・用量・投与スケジュール		
<p>3週(21日間)を1コースとして繰り返す。</p> <p>day 1-14</p> <p>1) XELとして2000mg/m²/day(体表面積)を分2で内服する</p> <p>day 1</p> <p>1) 前投薬:5-HT₃受容体拮抗型制吐剤+デカドロン 8~20 mg を投与する*</p> <p>2) 補液 1000~2000 mL を4時間以上かけて投与する</p> <p>3) CDDP:80 mg/m²(体表面積)を2時間かけて投与する</p> <p>4) 補液 1000~2000 mL を4時間以上かけて投与する</p> <p>*前投薬については必要に応じて、 NK₁受容体拮抗薬アプレピタント(商品名:イメンド)を day1 に 120 mg, day2-3 に 80 mg/day を投与する</p>		
Evidence	<p>① ML17032 試験(Y.K-Kang et al. Annal of Oncol 20:666-673,2009)</p> <p>② ToGA 試験(BangYJ, et al: Lancet 376: 687-697, 2010)</p>	
備考		
がん化学療法委員会承認日: 23.5.17		