

# 抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2022年 1月 8日							
申請者	所属科:外科	医師名:谷口 仁章						
<b>抗癌剤プロトコール内容</b>								
略名	オプジーボ+SOX							
適応臓器名	進行・再発胃癌							
薬剤名	オプジーボ点滴静注（一般名：ニボルマブ(遺伝子組換え)） エスワンタイホウ（一般名：テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤） オキサリプラチン点滴静注液（一般名：オキサリプラチン）							
注意点	各薬剤の注意点を遵守すること。 オプジーボの投与にあたっては、インラインフィルター(0.2又は0.22 $\mu$ m)を使用すること。							
<b>用法・用量・投与スケジュール</b>								
3週（21日間）を1コースとして繰り返す day1 生食 100mL オプジーボ点滴静注 360mg 30分以上かけて投与  オキサリプラチンとして 130mg/m <sup>2</sup> （体表面積）を2時間以上かけて投与する。 day1 夕食後～day15 朝食後 TS1として 80mg/m <sup>2</sup> /day(体表面積)を分2で経口投与 S1 標準投与量（1日量）								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1.25 m<sup>2</sup>未満</td> <td style="width: 40%;">80mg</td> </tr> <tr> <td>1.25 m<sup>2</sup>以上 1.5 m<sup>2</sup>未満</td> <td>100mg</td> </tr> <tr> <td>1.5 m<sup>2</sup>以上</td> <td>120mg</td> </tr> </table>			1.25 m <sup>2</sup> 未満	80mg	1.25 m <sup>2</sup> 以上 1.5 m <sup>2</sup> 未満	100mg	1.5 m <sup>2</sup> 以上	120mg
1.25 m <sup>2</sup> 未満	80mg							
1.25 m <sup>2</sup> 以上 1.5 m <sup>2</sup> 未満	100mg							
1.5 m <sup>2</sup> 以上	120mg							
Evidence	各薬剤添付文書 適正使用ガイド							
備考								
がん化学療法委員会承認日:2022年 2月								