

抗がん剤プロトコール 届け票

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| 申請日 | 平成 年 月 日 20. 4. 16 | | |
| 申請者 | 所属科: 外科 | 医師名; 石田秀之 | 印 |
| 抗癌剤プロトコール内容 | | | |
| 略名 | GEM | | |
| 適応臓器名 | 膵癌、胆道癌、非小細胞肺癌 | | |
| 薬剤名 | 注射用塩酸ゲムシタビン(GEM) (商品名: ジェムザール注射用) | | |
| 注意点 | 禁忌: 胸部への放射線療法を施行している患者。本剤と胸部への根治的放射線療法との併用により、重篤な食道炎、肺臓炎が発現し、死亡に至った例が報告されている。 30 分で点滴静脈内投与し、皮下、筋肉内には投与しないこと。 1回の点滴を 60 分以上かけて行うと副作用が増強した例が報告されている。 骨髄抑制や間質性肺炎に起因したと考えられる死亡例が報告されている。 胆道癌での術後補助化学療法における有効性及び安全性は確立していない。 | | |
| 用法・用量・投与スケジュール | | | |
| 成人には 1 回 1000 mg/m ² を 30 分かけて点滴静注し、週 1 回投与を 3 週連続し、4 週目は休薬する。 本剤投与前に前投薬(5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤+デカドロン 8~20mg)を行う。 | | | |
| Evidence | 添付文書。 | | |
| 備考 | | | |
| がん化学療法委員会承認日: 20. 4. 21 | | | |