

# 抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2022年 4月 1日	
申請者	所属科:血液内科	医師名: 和田 恵里

## 抗がん剤プロトコール内容

略名	EPd 療法 (エムプリシティ+ポマリスト)	
適応臓器名	再発または難治性の多発性骨髄腫	
薬剤名	エムプリシティ 一般名 エロツズマブ (遺伝子組換え) 注射液 ポマリストカプセル 一般名 ポマリドミド水和物カプセル デカドロン錠 or デキサート注 一般名 デキサメタゾン	
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。	

## 用法・用量・投与スケジュール

4週間隔で投与 クール数によって エムプリシティ投与日注意

**Day1, 8, 15, 22 (初回~2クール) Day1 (3クール以降)**

カロナール 200mg 3錠 1錠エムプリシティ投与1から3時間前に内服

生食 100mL

デキサメタゾン 6.6mg 1V (患者に合わせて適宜調整も可) 40mg まで

ファモチジン 20mg 1A

ポララミン 2mg 1A 30分で投与


生食 250mL

エムプリシティ点滴静注用 10mg/kg

(3クール以降は 20mg/kg)

注射用蒸留水 20mL

30mL/hr から開始 (下表参照)



10mg/kg投与時の投与速度

投与時期	投与速度 (mL/分)		
	投与開始 0~30分	投与開始 30~60分	投与開始 60分以降
第1サイクル	初回投与	0.5	1
	2回目投与	3	4
	3及び4回目投与	5	
第2サイクル以降	5		

20mg/kg投与時の投与速度(ポマリドミド及びデキサメタゾン併用時、第3サイクル以降)

投与時期	投与速度 (mL/分)	
	投与開始 0~30分	投与開始 30分以降
1回目投与	3	4
2回目投与以降	5	

**Day1-21**

ポマリスト 4mg 内服

21日間内服 7日間休薬

デキサメタゾン 40mg 週

(患者に合わせて適宜減量も可)

Evidence	エムプリシティ・ポマリスト添付文書 エムプリシティ適正使用ガイド
----------	-------------------------------------

備考

がん化学療法委員会承認日: 2022年 5月 16日