

抗がん剤プロトコール 届け票

| | | |
|---|--|------------|
| 申請日 | 2020年 8月 5日 | |
| 申請者 | 所属科:内科 | 医師名: 井上 敦司 |
| 抗がん剤プロトコール内容 | | |
| 略名 | CHASE 療法 | |
| 適応臓器名 | 非ホジキンリンパ腫 | |
| 薬剤名 | デキサート注 (一般名: 一般名: デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液) エトポシド注 (一般名: エトポシド注射液) エンドキサン (一般名: シクロフォスファミド) キロサイド (一般名: シタラビン注射液) | |
| 注意点 | 薬剤の注意点を遵守すること。 | |
| 用法・用量・投与スケジュール | | |
| 3週を1サイクルとして繰り返す Day1-3 アプレミタム cap125mg 1cap 内服 (Day1のみ) 生食 100mL + パロセトロン 0.75mg (Day1のみ) + デキサート 6.6mg 5V (33mg) 30分で投与 5%ブドウ糖液 500mL + エトポシド 100mg/m² 90分で投与 Day1のみ 生食 500mL + エンドキサン 1200mg/m² 120分で投与 生食 100mL + ウロミテキサン (メスナ) 480mg/m ² エンドキサンと同時に 30分で投与 生食 100mL + ウロミテキサン (メスナ) 480mg/m ² エンドキサン開始4時間後 30分で投与 生食 100mL + ウロミテキサン (メスナ) 480mg/m ² エンドキサン開始8時間後 30分で投与 Day2-3 アプレミタム cap80mg 1cap 内服 5%ブドウ糖 250mL + キロサイド 2000mg/m² 3時間で投与 総量 300mL~500mL に調整 生食 50mL でフラッシュ 副作用対策 キロサイドによる結膜炎予防のため リンデロン点眼液 1日3回 両眼 5日間投与する。 エンドキサンによる出血性膀胱炎予防のため、ウロミテキサン (メスナ) を投与する。 ウロミテキサン (メスナ) 1回投与量 = エンドキサン1日投与量の40%を投与する。 | | |
| Evidence | 造血器腫瘍診療ガイドライン 2018年 各薬剤添付文書 | |
| 備考 | 必要に応じ G-CFS 製剤の投与をする。 | |
| がん化学療法委員会承認日: 2020年 8月 17日 | | |