

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2022年 11月 1 日									
申請者	所属科:血液内科	医師名: 井上 敦司								
抗がん剤プロトコール内容										
略名	Pola-BR 療法									
適応臓器名	再発又は難治性のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫(DLBCL)									
薬剤名	商品名 ポライビー点滴静注 リツキサン注 トレアキシ注 一般名 ホラツブマブ ベトドチン									
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。									
用法・用量・投与スケジュール										
<p>3 週間隔 6 クール投与</p> <p>Day1 (リツキサン)</p> <p>セレスタミン配合錠 1錠+ロキソプロフェン 60mg 1錠</p> <p>リツキサン投与30分前に内服</p> <p>生食 100mL+ソルコーテフ 100mg 1V</p> <p>生食 500mL+リツキサン (リツキシマブ) 375mg/m²</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">速度 (初回)</td> <td style="width: 50%;">速度 (2回目以降)</td> </tr> <tr> <td>点滴開始から1時間後 25mL/hr</td> <td>点滴開始から1時間後 100mL/hr</td> </tr> <tr> <td>1時間後～2時間後 100mL/hr</td> <td>1時間後～終了まで 200mL/hr</td> </tr> <tr> <td>2時間後～終了まで 200mL/hr</td> <td></td> </tr> </table> <p>リツキサン (リツキシマブ) 投与中は患者の状態をよく確認すること</p> <p>Day2 (ホラ化[®]+トレアキシ)</p> <p>セレスタミン配合錠 1錠+ロキソプロフェン 60mg 1錠</p> <p>ホラ化[®]投与30分前に内服</p> <p>生食 100mL+ソルコーテフ 100mg 1V 30分で投与</p> <p>生食 100mL+ホラ化[®] 1.8mg/kg (ホラ化[®]は蒸留水で溶解する)</p> <p>初回 90分 2回目以降 30分まで短縮化</p> <p>生食 100mL+パロセトロン 0.75mg (+デキサート 6.6mg 1V) 30分で投与</p> <p>生食 50mL+トレアキシ 90mg/m² 60分で投与 ホラ化[®]投与終了後 30分以上間隔を空ける</p> <p>生食 50mL でフラッシュ</p> <p>Day3 (トレアキシ)</p> <p>生食 100mL+パロセトロン 0.75mg (+デキサート 6.6mg) 1V 30分で投与</p> <p>生食 250mL+トレアキシ 90mg/m² 60分で投与</p> <p>生食 50mL でフラッシュ</p> <p>2クール目以降はリツキサン+ホラ化[®]+トレアキシを Day1 にトレアキシを Day2 にすることも可能</p> <p>トレアキシは生食 50mL+トレアキシ 90mg/m² 10分で投与することも可能</p>			速度 (初回)	速度 (2回目以降)	点滴開始から1時間後 25mL/hr	点滴開始から1時間後 100mL/hr	1時間後～2時間後 100mL/hr	1時間後～終了まで 200mL/hr	2時間後～終了まで 200mL/hr	
速度 (初回)	速度 (2回目以降)									
点滴開始から1時間後 25mL/hr	点滴開始から1時間後 100mL/hr									
1時間後～2時間後 100mL/hr	1時間後～終了まで 200mL/hr									
2時間後～終了まで 200mL/hr										
Evidence	ポライビー添付文書・適正使用ガイド トレアキシ添付文書									
備考										
がん化学療法委員会承認日:2022年 11月 21日										