

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2022年 9月1 日		
申請者	所属科:血液内科	医師名: 井上 敦司	
抗がん剤プロトコール内容			
略名	Pola-R-CHP 療法		
適応臓器名	未治療のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫(DLBCL)		
薬剤名	商品名	ポライビー点滴静注	リツキサン注
	一般名	ポラツマブ	ベトチン
		ドキシソルビシン	エンドキサン
		トキシルビシン	シクロホスファミド
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。		
用法・用量・投与スケジュール			
3 週間隔 6 クール投与 リツキサンのみ 8 クール投与			
Day1-5			
プレドニゾロン 100mg/body/日 (プレドニン 5mg 20錠 分3 毎食後 例朝 10-昼 7-夕 3)			
①Day1 (リツキサン) (投与タイミングは Day2 以降でも可能)			
セレスタミン配合錠 1錠+ロキソプロフェン 60mg 1錠			
リツキサン投与 30分前に内服			
生食 100mL+ソルコーテフ 100mg 1V			
生食 500mL+リツキサン (リツシマブ) 375mg/m ²			
速度 (初回)		速度 (2回目以降)	
点滴開始から 1 時間後 25mL/hr		点滴開始から 1 時間後 100mL/hr	
1 時間後~2 時間後 100mL/hr		1 時間後~終了まで 200mL/hr	
2 時間後~終了まで 200mL/hr			
リツキサン (リツシマブ) 投与中は患者の状態をよく確認すること			
②Day1 (ポライビー+トキシルビシン+シクロホスファミド)			
セレスタミン配合錠 1錠+ロキソプロフェン 60mg 1錠			
ポライビー投与 30分前に内服			
生食 100mL+ソルコーテフ 100mg 1V 30分で投与			
生食 100mL+ポライビー 1.8mg/kg (ポライビーは蒸留水で溶解する)			
初回 90分 2回目以降 30分まで短縮化			
パロセトロンハググ 0.75mg/50mL 30分で投与			
生食 100mL+トキシルビシン 50mg/m ² 30分で投与 ポライビー投与終了後 30分以上間隔を空ける			
生食 500mL+エンドキサン 750 mg/m ² 120分で投与			
生食 50mL でフラッシュ			
①②は別日に投与することも可能			
Evidence	ポライビー添付文書・適正使用ガイド POLARIX 試験		
備考			
がん化学療法委員会承認日:2022年 11月 21日			