

# 抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2020年 2月 17 日	
申請者	所属科:血液内科	医師名: 井上 敦司
<b>抗がん剤プロトコール内容</b>		
略名	THP-COP	
適応臓器名	非ホジキンリンパ腫	
薬剤名	ピノルビン (一般名:ピラルビシン) 会社名未 オンコビン(一般名:ビンブラスチン) エンドキサン(一般名:シクロフォスファミド) プレドニゾロン錠 (一般名:プレドニゾロン)	
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。	
<b>用法・用量・投与スケジュール</b>		
3週1サイクルとして繰り返す。 <b>day1</b> 前投薬: 5HT <sub>3</sub> 拮抗剤+ホスアプレピタント (プロイマント) を30分で投与 5%ブドウ糖 100mL+ピノルビン 30mg/m <sup>2</sup> を30分かけて投与。 生食 100mL+オンコビン 1.4mg/m <sup>2</sup> を30分かけて投与。2mg/bodyを超えないこと 生食 500mL+エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup> を120分かけて投与。  <b>day1-5</b> プレドニゾロン 100mg/body/日 (プレドニン 5mg 20錠 分3 毎食後 例朝10-昼7-夕3)		
Evidence	造血器腫瘍診療ガイドライン 2018年	
備考	オンコビンは2mg/bodyを超えないこと	
がん化学療法委員会承認日:2020年 2月 17日		