

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2020年 4月3 日	
申請者	所属科:血液内科	医師名: 井上 敦司
抗がん剤プロトコール内容		
略名	VNCOP-B	
適応臓器名	B細胞性非ホジキンリンパ腫	
薬剤名	商品名 (一般名) ノバントロン注 (ミトキサントロン)、エンドキサン注 (シクロホスファミド)、オンコビン注 (ビンクリスチン)、エトポシド注 (エトポシド)、ブレオ注 (ブレオマイシン)、プレドニゾロン錠 (プレドニゾロン)	
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。	
用法・用量・投与スケジュール		
8 週間隔 Day1, 15, 29, 43 プレドニゾロン 1日 40mg/body 3日間内服 4日休薬 グラニセトロン 3mg バッグ 100mL 30分で投与 生食 100mL+ノバントロン 8.1mg/m² 30分で投与 生食 500mL+7%メイロン 20mL+エンドキサン 300mg/m² 120分で投与 Day8, 36 プレドニゾロン 1日 40mg/body 3日間内服 4日休薬 グラニセトロン 3mg バッグ 100mL 30分で投与 生食 100mL+オンコビン 2mg/body 30分で投与 5%ブドウ糖 500mL+エトポシド 150mg/m² 120分で投与 Day22, 50 プレドニゾロン 1日 40mg/body 3日間内服 4日休薬 グラニセトロン 3mg バッグ 100mL 30分で投与 生食 100mL+オンコビン 2mg/body 30分で投与 生食 100mL+ブレオ 10mg/m² 120分で投与 (70歳以上はブレオ 8mg/m² とする) 側管より ソルコーテフ 100mg を投与 (ブレオによる薬剤熱予防)		
Evidence	高齢者 aggressive 非ホジキンリンパ腫に対する VNCOP-B 療法有効性と安全性に関する 検討 癌と化学療法 Volume32,Issue1,39-44(2005) 四天王寺病プロトコール	
備考	70歳以上は点滴投与 3日目から G-CSF 製剤を 5日間投与する	
がん化学療法委員会承認日:2020年 5月 日		