

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2021年 6月 17 日	
申請者	所属科:血液内科	医師名: 井上 敦司
抗がん剤プロトコール内容		
略名		
適応臓器名	CD20 陽性の濾胞性リンパ腫	
薬剤名	商品名 ガザイバ点滴静注 一般名 オビヌツズマブ (遺伝子組換え) 注	
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。	
用法・用量・投与スケジュール		
4 週間隔 (トレアキシムと併用の場合) 3 週間隔 (CHOP 又は CVP と併用の場合) 24 週間 Day1 (初回クールのみ day8, 15 も投与) 生食 100mL + ソルコーテフ 100mg 1V ガザイバ投与開始 1 時間前に投与終了		
セレスターナ配合錠 1 錠 + ロキソプロフェン 60mg 1 錠 ガザイバ投与 30 分前に内服 生食 250mL + ガザイバ 1000mg/body 全量 250mL に調整 インラインフィルター・輸液ポンプを使用して投与		
速度 (初回)	速度 (2 回目以降)	
点滴開始から 30 分後 12.5mL (50mg) /hr	点滴開始から 30 分後 25mL (100mg) /hr	
30 分～60 分後 25mL (100mg) /hr	30 分～60 分後 50mL (200mg) /hr	
60 分～90 分後 37.5mL (150mg) /hr	60 分～90 分後 75mL (300mg) /hr	
90 分～120 分後 50mL (200mg) /hr	90 分～終了まで 100mL (400mg) /hr	
120 分～150 分後 62.5mL (250mg) /hr		
150 分～180 分後 75mL (300mg) /hr		
180 分～210 分後 87.5mL (350mg) /hr		
210 分～終了まで 100mL (400mg) /hr		

ガザイバ投与中は患者の状態をよく確認すること。問題なければ上記表の速度で投与する。
同日日に併用レジメンを投与する場合は 30 分以上間隔を置いて開始する。

Evidence	ガザイバ添付文書・適正使用ガイド
備考	24 週間投与後 維持療法としてガザイバ単独で 2 か月に 1 回、2 年間投与する
がん化学療法委員会承認日: 2022 年 2 月 21 日	