

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2023年 7月 17日	
申請者	所属科:血液内科	医師名: 和田 恵里
抗がん剤プロトコール内容		
略名		
適応臓器名	再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫	
薬剤名	商品名 ジフォルタ注射液 20mg 一般名 プララトレキサート 20mg	
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。	
用法・用量・投与スケジュール		
7 週間隔 6 投 1 休		
Day1		
生食 50mL + ジフォルタ注射液 30mg/m ² 5 分で投与		
Day2		
ロイコリン錠 5mg 15 錠 分 3 毎食後 2 日分		
ジフォルタ投与 24 時間後より開始、次回ジフォルタ投与前 72 時間は内服しない。		
口内炎の発症がなければ、次回以降 ロイコリン 5mg 9 錠への減量可能。		
副作用を軽減するため、以下のように葉酸及びビタミン B12 を投与すること。		
・ ジフォルタ投与日の 10 日以上前から、葉酸として 1 日 1 回 1.0~1.25mg を連日経口投与する。本剤の投与終了日から 30 日間は投与を継続する。		
・ ジフォルタ投与日の 10 日以上前から、ビタミン B12 として 1 回 1mg を 8~10 週ごとに筋肉内投与する。本剤投与中は、投与を継続する。		
必要に応じクライオセラピーも考慮する。		
Evidence	ジフォルタ・ロイコリン錠添付文書	
備考		
がん化学療法委員会承認日: 2023年 8月 21日		