

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2022 年 11 月 1 日	
申請者	所属科:血液内科	医師名: 井上 敦司
抗がん剤プロトコール内容		
略名		
適応臓器名	低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫、慢性リンパ性白血病	
薬剤名	商品名 トレアキシシ点滴静注用 一般名 ベンダムスチン塩酸塩	
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。	
用法・用量・投与スケジュール		
<p>低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫 (抗 CD20 抗体併用の場合) マントル細胞リンパ腫(未治療の場合) 慢性リンパ性白血病</p> <p>4 週間隔</p> <p>Day1、2 生食 100mL + パロセトロン 0.75mg (Day1 のみ) + デキサート 6.6mg 1V 30 分で投与 生食 250mL + トレアキシシ 90mg/m² 60 分で投与 (慢性リンパ性白血病の場合は 100mg/m²) 生食 50mL でフラッシュ</p> <p>少なくとも 26 日間休薬する</p> <p>低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫(単独投与の場合(再発又は難治性の場合に限る)) マントル細胞リンパ腫(再発又は難治性の場合)</p> <p>3 週間隔</p> <p>Day1、2 生食 100mL + パロセトロン 0.75mg (Day1 のみ) + デキサート 6.6mg 1V 30 分で投与 生食 250mL + トレアキシシ 120mg/m² 60 分で投与 生食 50mL でフラッシュ 少なくとも 19 日間休薬する</p> <p>トレアキシシは生食 50mL で 10 分投与も可能</p>		
Evidence	トレアキシシ添付文書	
備考	必要に応じアプレピタントも併用する。	
がん化学療法委員会承認日: 2022 年 11 月 21 日		