

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2020年 2月 17 日									
申請者	所属科:血液内科	医師名: 井上 敦司								
抗がん剤プロトコール内容										
略名										
適応臓器名	1. CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫。 2. 免疫抑制状態下のCD20陽性B細胞性リンパ増殖性疾患。									
薬剤名	商品名 リツキサシ注 (先発品) リツキシマブ注「KHK」 (後発品) 一般名 リツキシマブ (遺伝子組換え) 注射液									
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。									
用法・用量・投与スケジュール										
<p>1 週間隔</p> <p>Day1</p> <p>セレスターナ配合錠 1錠+ロキソプロフェン 60mg 1錠</p> <p>リツキサシ投与30分前に内服</p> <p>生食 100mL+ソルコーテフ 100mg 1V</p> <p>生食 500mL+リツキサシ (リツキシマブ) 375mg/m²</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">速度 (初回)</td> <td style="width: 50%;">速度 (2回目以降)</td> </tr> <tr> <td>点滴開始から1時間後 25mL/hr</td> <td>点滴開始から1時間後 100mL/hr</td> </tr> <tr> <td>1時間後～2時間後 100mL/hr</td> <td>1時間後～終了まで 200mL/hr</td> </tr> <tr> <td>2時間後～終了まで 200mL/hr</td> <td></td> </tr> </table> <p>リツキサシ (リツキシマブ) 投与中は患者の状態をよく確認すること。</p>			速度 (初回)	速度 (2回目以降)	点滴開始から1時間後 25mL/hr	点滴開始から1時間後 100mL/hr	1時間後～2時間後 100mL/hr	1時間後～終了まで 200mL/hr	2時間後～終了まで 200mL/hr	
速度 (初回)	速度 (2回目以降)									
点滴開始から1時間後 25mL/hr	点滴開始から1時間後 100mL/hr									
1時間後～2時間後 100mL/hr	1時間後～終了まで 200mL/hr									
2時間後～終了まで 200mL/hr										
Evidence	リツキサシ添付文書									
備考										
がん化学療法委員会承認日:2020年 2月 17日										