

# 抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2021年 4月 20日	
申請者	所属科:血液内科	医師名: 井上 敦司
<b>抗がん剤プロトコール内容</b>		
略名		
適応臓器名	再発又は難治性のB細胞性急性リンパ性白血病	
薬剤名	商品名 ビーリンサイト点滴静注用 一般名 ブリナツモマブ（遺伝子組換え）注射液	
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。	
<b>用法・用量・投与スケジュール</b>		
28日間連日投与 14日間休薬 これを1サイクルとして最大5サイクル繰り返す、その後 28日間連日投与 56日間休薬 これを1サイクルとして最大4サイクル繰り返す 1サイクル目 Day1、8 生食 100mL + デキサメタゾン 6.6mg 3V ビーリンサイト投与 1時間以内 ビーリンサイト投与とは別ルートで Day1～7 生食 250mL + ビーリンサイト 5 $\mu$ g/m <sup>2</sup> （上限 9 $\mu$ g） 10mL/hr Day8～28 生食 250mL + ビーリンサイト 15 $\mu$ g/m <sup>2</sup> （上限 28 $\mu$ g） 10mL/hr 2サイクル目以降 Day1 生食 100mL + デキサメタゾン 6.6mg 3V ビーリンサイト投与 1時間以内 ビーリンサイト投与とは別ルートで Day1～28 生食 250mL + ビーリンサイト 15 $\mu$ g/m <sup>2</sup> （上限 28 $\mu$ g） 10mL/hr		
ビーリンサイト投与注意点 投与速度を変更しない ケモ本体でプライミング フラッシュを行わない インラインフィルターを使用		
ビーリンサイト溶解方法 生食を 270mL に調整 安定化液 5.5mL を混合。  注射用水 3mL で溶解 12.5 $\mu$ g/mL となる 必要量を上記生食のボトルに 混合する  安定化液で溶解しない！！		
Evidence	ビーリンサイト添付文書、適正使用ガイド	
備考	ビーリンサイト調整・投与マニュアル参照すること	
がん化学療法委員会承認日: 2022年 2月 21日		