

抗がん剤プロトコール 届け票

| | | |
|--|---|---------|
| 申請日 | 2019年 10月 10日 | |
| 申請者 | 所属科: 口腔外科 | 医師名: 松岡 |
| 抗がん剤プロトコール内容 | | |
| 略名 | PTX+Cmab | |
| 適応臓器名 | 頭頸部がん | |
| 薬剤名 | アビタックス (一般名: セツキシマブ) パクリタセル (一般名: パクリタキセル) | |
| 注意点 | 薬剤の注意点を遵守すること。 | |
| 用法・用量・投与スケジュール | | |
| <p>毎週投与</p> <p>パクリタセル 80mg/m² day1</p> <p>アビタックス 400mg/m² (初回) day1 その後 250mg/m² (2回目以降) を毎週投与</p> <p>初回</p> <p>前投薬: 5HT₃拮抗剤+ホスアプレピタント (プロイメント) +ホララミン 5mg+デキサメタゾン 9.9mg を 30分で投与 生食 500mL+アビタックス 400mg/m² (初回) を 2時間かけて投与。</p> <p>2クール目以降は生食 250mL+アビタックス 250mg/m² 1時間かけて投与。</p> <p>生食 50mL でルートフラッシュ</p> <p>生食 250mL+パクリタセル 80mg/m² を 1時間かけて投与。</p> <p>2回目以降</p> <p>前投薬: 5HT₃拮抗剤+ホスアプレピタント (プロイメント) +ホララミン 5mg+デキサメタゾン 9.9mg を 30分で投与 生食 250mL+アビタックス 250mg/m² 1時間かけて投与。</p> <p>生食 50mL でルートフラッシュ</p> <p>生食 250mL+パクリタセル 80mg/m² を 1時間かけて投与。</p> | | |
| Evidence |) | |
| 備考 | | |
| がん化学療法委員会承認日: 2019年 11月 18日 | | |