

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	平成 年 月 日 20. 4. 19		
申請者	所属科:外科	医師名:石田秀之	印
抗がん剤プロトコール内容			
略名	TXT		
適応臓器名	乳癌、非小細胞肺癌、胃癌、頭頸部癌、食道癌、卵巣癌、子宮体癌（前立腺癌）		
薬剤名	ドセタキセル水和物注射剤 (DOC/TXT) (商品名:タキソテール注)		
注意点	<p>用量規制因子は好中球減少である。</p> <p>重篤な骨髄抑制(主に好中球減少)、重症感染症などの重篤な副作用及び本剤との因果関係が否定できない死亡例が報告されている。</p> <p>前立腺癌に対しては、NCCN のガイドラインや文献 ①などを参考に投与が行われている。</p> <p>溶解液に溶解後は速やかに生理食塩水又は5%ブドウ糖液に混和すること。</p> <p>他剤との混注は行わないこと。</p> <p>必ず点滴静脈内投与とし、皮下、筋肉内には投与しないこと。</p> <p>静脈内投与に際し、薬液が血管外に漏れると、注射部位に硬結・壊死を起こすことがある。</p>		
用法・用量・投与スケジュール			
<p>乳癌、非小細胞肺癌、胃癌、頭頸部癌では</p> <p>施右仁には1日1回、60 mg/m²(体表面積)を1時間以上かけて3〜4週間隔で点滴静注する。</p> <p>1回最高用量は70 mg/m²とする。</p> <p>食道癌、卵巣癌、子宮体癌では</p> <p>成人には1日1回、70 mg/m²(体表面積)を1時間以上かけて3〜4週間隔で点滴静注する。</p>			
Evidence	<p>添付文書。</p> <p>NCCN ガイドライン。</p> <p>文献 ① Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer (Ilan F, et al. N Engl J Med 35:1502-1512, 2004)</p>		
備考			
がん化学療法委員会承認日: 20. 4. 21			