

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2024年6月22日	
申請者	外科	谷口 仁章
抗がん剤プロトコール内容		
略名	オプジーボ+FP	
適応臓器名	食道がん	
薬剤名	オプジーボ（一般名：ニボルマブ） フルオロウラシル（一般名：フルオロフラシル） シスプラチン（一般名：シスプラチン）	
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。	
用法・用量・投与スケジュール		
4週1サイクルとして繰り返す。 オプジーボ 480mg/body day1 シスプラチン 80mg/m ² day1 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 day1 水分負荷として投与前後に2000mL程度投与すること。 前投薬：5-HT ₃ 拮抗剤+ホスアプレピタント（プロイムト）+デキサメタゾン9.9mgを30分で投与 生食100mL+オプジーボ480mgを30分以上かけて投与。 生食500mL+シスプラチン 80mg/m ² を2時間かけて投与。 フルオロウラシル 800mg/m ² を持続点滴 Day2-5 デキサメタゾン6.6mg 30分で投与 フルオロウラシル 800mg/m ² を持続点滴		
Evidence		
備考	シスプラチン投与中は尿量確保に注意し必要に応じてマンニトール・フロセミドなどの利尿剤を投与すること。	
がん化学療法委員会承認日：		